



2. Cần làm gì khi cúm gia cầm xảy ra trong khu vực của bạn?

- ▶ Cọ sạch bồn, rửa bằng xà phòng và khử trùng chuồng, trại, phương tiện vận chuyển và cả khu vực xung quanh bằng cách phun một trong các loại hoá chất khử trùng như Clo-rin (Chlorine), hay Clo-ra-min (Chloramine) T-3%, hoặc nước vôi (10 kg vôi tôi với 100 lít nước). Cần để phòng nước vôi chảy vào mắt và da khi sử dụng. Quét sạch và phun cả khu vực sân và xung quanh.
- ▶ Rửa máng ăn, máng uống bằng nước sạch, sau đó khử trùng bằng formalin.
- ▶ Cọ rửa sạch giày, dép, các dụng cụ, bánh xe, lốp xe và khử trùng qua hố khử trùng ở cổng trại trước khi vào và sau khi rời chuồng trại chăn nuôi. Nên đổi dép khác khi đi ra ngoài.
- ▶ Không cho phương tiện đi lại vào khu vực trại nuôi.
- ▶ Rửa tay sạch bằng xà phòng trước và



sau khi tiếp xúc với gia cầm.

- ▶ Thay và giặt sạch quần áo sau khi tiếp xúc với gia cầm.
- ▶ Không để nhữn g n g ư ờ i không có trách nhiệm ra vào khu vực chuồng, trại chăn nuôi.



- ▶ Không mua bán và vận chuyển gia cầm ốm, chết.

3. Làm gì khi dịch cúm gia cầm xảy ra trong trại của bạn?

- ▶ Báo ngay cho trưởng thôn hay cán bộ thú y khi thấy gia cầm đột ngột chết hàng loạt, hoặc gọi số điện thoại miễn phí 1-800-5555-02. Không vứt xác gia cầm chết bừa bãi.
- ▶ **Chỉ tiêu huỷ gia cầm dưới sự hướng dẫn của cán bộ thú y.** Khi tiêu huỷ, phải đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay, khẩu trang khi cho gia cầm chết vào bao ni lông. Không vứt xác gia cầm chết bừa bãi. Sau khi tiêu huỷ, phải tắm rửa sạch sẽ và thay, giặt quần áo bằng xà phòng.
- ▶ Chôn, hoặc ủ làm phân chất thải gia cầm

(lông, phân, vv) như đối với gia cầm chết.

- ▶ Không cho mọi người (các thành viên gia đình, trẻ em, hàng xóm) không có trách nhiệm đến khu vực tiêu huỷ.
- ▶ Theo sự hướng dẫn của cán bộ thú y, đào hố chôn với độ sâu, rộng tuỳ theo lượng gia cầm tiêu huỷ. Hố phải cách xa khu vực chăn nuôi và nhà ở 500m. Dưới đáy hố phủ một lớp vôi bột dày 30-40cm. Cho gia cầm chết và chất thải của chúng xuống hố. Rắc vôi bột lên giữa các lớp và lớp trên cùng rồi lấp đất dày từ 1 đến 1,5m.



- ▶ Khử trùng chuồng trại ít nhất hai tuần một lần. Để trống trại ít nhất hai đến ba tháng. Phải phun khử trùng trước khi nuôi trở lại. Trại

phải được cán bộ thú y kiểm tra trước khi nuôi lại.

- ▶ Chỉ sử dụng các con giống (gà con, vịt con) đã được kiểm dịch và tiêm vắc xin từ những trại, hay vùng không có dịch để tái đàn.
- ▶ Không bán hay ăn thịt gia cầm chết.