




PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM ĐỂ CHĂN NUÔI BỀN VỮNG



Hà Nội - 2007

1. Làm gì để phòng dịch cúm gia cầm cho gia cầm?

- ▶ Chỉ mua gia cầm đã được kiểm dịch (gà, vịt) từ các trại được phép nuôi gia cầm giống và không bị bệnh dịch.
- ▶ Nhốt riêng gia cầm mới đem về ít nhất 2 tuần.
- ▶ Luôn nhốt riêng các loại gia cầm, ví dụ tách riêng gà và vịt.
- ▶ Nuôi nhốt gia cầm trong khu vực có hàng rào.
- ▶ Vệ sinh, khử trùng chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi trước khi nuôi gia cầm và sau khi xuất chuồng.
- ▶ Chăm sóc tốt gia cầm, cho gia cầm ăn thức ăn sạch và uống nước sạch.
- ▶ Hằng ngày phải quan sát xem gia cầm khỏe, hay ốm, và có ăn uống bình thường không.
- ▶ Vệ sinh chuồng trại hằng ngày. Thu dọn các chất thải như phân, lông và các chất độn chuồng đưa ra ngoài xa để đốt, chôn, hoặc cho xuống hồ để ủ làm phân.
- ▶ Rửa kỹ máng ăn, máng uống hằng ngày. Không



sử dụng máng ăn, uống chung cho các loài gia cầm khác nhau.

- ▶ Gia cầm cần được tiêm vắc xin thường xuyên theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Để gia cầm không bị nhiễm cúm gia cầm, gà và vịt cần tiêm đủ hai mũi vắc xin, mỗi mũi cách nhau ít nhất hai tuần.
- ▶ Quét dọn chuồng, trại cả trong lẫn ngoài, sau đó khử trùng một tuần một lần bằng cách phun hoá chất khử trùng như BKA, hoặc BKC (theo hướng dẫn của nhà sản xuất về cách pha và liều lượng sử dụng).

Phải khử trùng các dụng cụ và thiết bị chăn nuôi. Quét sạch khu vực xung quanh chuồng trại, sau đó phải phun thuốc khử trùng trên cả nền đất.

- ▶ Phải có hố khử trùng bên ngoài cửa chuồng, cổng trại với các dung dịch như Crê-zin (Chresine), hoặc dùng nước vôi. Trước khi vào chuồng trại, giẫm giày, dép vào hố khử trùng. Các phương tiện sử dụng cũng phải qua hố khử trùng.

Các biện pháp này cần luôn được áp dụng cả vào thời điểm không có dịch và có dịch.

Chung sức vì một Việt Nam không cúm gia cầm!